

BLODSMITTE

STIKKSKADE/BLODSPRUT

Se prosedyre ID 64

1. STRAKSTILTAK

HUD

Vask huden godt med såpe og vann.
Desinfiser området med spritløsning dersom dette er tilgjengelig.

SLIMHINNER

Blodsprut/kroppsvæsker direkte på slimhinne i nese, øye eller munn: Skyll/spyl med lunka vann i noen minutter. Bruk ev. Munnskyllevann i munn.

2. KONTAKT LEGE

Lege*:

- Vurdere smitterisiko.
- Eventuelt iverksette profylakse snarest mulig.
- Informer den stikkskade om smitterisiko.

**Der man mangler lege: kontakt vakthavende lege ved medisin eller kirurgi.*

3. PROFYLAKSE

Ved høy risiko: Gi profylakse snarest mulig.

- For hepatitt B innen 48timer
- For hiv innen 72 timer (se prosedyre ID 65)

4. BLODPRØVER

Rekvireres av lege:

Den eksponerte: Ta 0-prøver (rekv. på papir!) samme dag.
Bruk **HER-id 155867, BHT HMR** slik at prøvesvar skal gå til BHT. **Kliniske opplysninger:** «0-prøve, stikkskade hos ansatt, seksjon der skaden skjedde, smittekilens PID-nr.....».

Smittekilde: Ta blodprøver (rekv. i ROS!). **Kliniske opplysninger:** «Involvert i stikkskade hos ansatt, dato og kl.»
Husk samtykke frå pasienten!

5. MELD SKADE

Fyll ut Yrkesrelatert skadeskjema i MinArbeidsplan.
Husk risikovurdering! (Under «Beskrivelse av hendelse»: for eksempel er smittekilden positiv for Hep B/Hiv?)