


# መረጃ ስለ ምጥን ማፋጠን ወይም ማስጀመር

በእርግዝና ወቅት በበሽታ ወይም ውስብስብ ችግሮች ሲኖር ምጥ ማስጀመር ብዙውን ጊዜ ይመከራል። ለእናት እና /ወይም ለልጅ የተሻለ አማራጭ ተደርጎ ሲወሰድ ብቻ ነው የሚከናወነው። ምጥን ማስጀመር ጊዜ የሚወስድ እና አድካሚ ሂደት ሊሆን ስለሚችል ይህንን የምንመርጥበት በቂ ምክንያት ሊኖር ይገባል። ምጥን እንዲጀመር ለማድረግ የምንሞክረው ሰውነት ራሱ ዝግጁ ከመሆኑ በፊት ነው። በዚህ ምክንያት የምጥ መጀመር ለአንዳንድ ሴቶች ብዙ ቀናት ሊወስድ ይችላል፤ ለሌሎች ደግሞ ጥቂት ሰዓታት ብቻ ይወስዳል። በእውቀት ላይ የተመሠረተ ምርጫ ማድረግ እንድትችሉ ጥሩ መረጃ እንድታገኙ እንረዳችላለን።

ምጥ እንዲጀምር የተደረገበት ጊዜ፣ የእንሸርት ውኃ መፍሰሱና አለመፍሰሱ እንዲሁም ከዚህ በፊት ወልደሽ ከሆነና ካልሆነ የምጥ ፍጥነት ይወስነዋል። ምጥን የማፋጠን ህክምና እስኪጀመር ድረስ ሰውነትሽ ምን ዓይነት ምላሽ እንደሚሰጥ አናውቅም። ከመጀመራችን በፊት ምጥን እንዴት እንደምናስጀምረው እቅድ እናወጣለን።

ዘዴው የሚወሰነው የማኅጸን ጫፍ ምን ያህል እንደሰሳ ነው። ሐኪሙ የማኅጸን መሳሳትን (የቢሾፕስ ውጤት) ለመገምገም ሁልጊዜ የሴት ብልት በኩል ምርመራ ያደርጋል። እንዲሁም የማኅጸን ጫፍ ርዝመት፣ አቀማመጥ፣ ምን ያህል ለስላሳ እንደሆነ፣ መከፈት መጀመሩን እና የሕፃኑ አቀማመጥ ይመረምራል። ከዚያ ሐኪሙ የትኛውን ዘዴ መጠቀም እንዳለበት ይወስናል።



© K. C. Toverud



ምጥ እንዲፋጠን ወይም እንዲጀምር የሚደረግላቸው ሴቶች በወሊድ ክፍል መውለድ አለባቸው። የመውለዱ ሂደትም ራሱ በውኃ ውስጥ ሊከናወን አይችልም።

በቂ የሰው አቅም ከሌለን የመውለጃ ግዜ ለተወሰነ ቀናት ልናራዝመው እንችላለን።

Illustrasjon: Eline Skirnisdottir Vik



አንዳንድ ሴቶች ምጥቸው እንዲፋጠን ወይም እንዲጀምር በሚደረግበት ሂደት በጣም ይደክማሉ። እንቅልፍ ማጣትና ህመም የበዛበት የማህፀን መኮማተር በጣም ከባድ ሊሆንብሽ ይችላል። ስለሆነም በቀን ውስጥ እንኳን ቢሆን ጥሩ ዕረፍት ማድረግ ወይም መተኛት አስፈላጊ ነው። ተጨማሪ ኃይል እንድታገኙ ቀለል ያሉ ምግቦች መመገብና ብዙ ውኃ መጠጣት አለብሽ።

ልጅ መውለድ ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ አዎንታዊ ተሞክሮ መሆን አለበት። ጥሩ መመሪያም ታገኝያለሽ።

Illustrasjon: Eline Skirnisdottir Vik

ከፊኛ ካቴተር የሚደረግ ምጥ ማስጀመር ፊኛ ካቴተር በተለምዶ ከሽንት ፊኛ ላይ ሽንትን ለማፍሰስ የሚያገለግል ቀጭን የጎማ ቧንቧ ነው።

ካቴተር በሴት ብልት በኩል ወደ ማህጸን ውስጥ ይገባል፣ በማህጸን ጭፍ በኩል እና በውስጥኛው የማህጸን ጭፍ በኩል ያልፋል። በሕፃኑ ራስ እና በማህጸን ጭፍ መካከል መተኛት አለበት። ካቴቴሩ በቦታው ከገባ በኋላ በካቴተር መጨረሻ ላይ ያለው ፊኛ በንጹህ ጨዋማ ውሃ ይሞላል።

ከፊል ካቴተር ከሴት ብልት ውስጥ ይንጠለጠላል። ይህ ከጭንዎ ጋር በቴፕ ይያያዛል። እንደ እንቅስቃሴ እና የመፀዳጃ ጉብኝት ያሉ መደበኛ እንቅስቃሴዎችን አይከላከልም። ካቴተር ከገባ በኋላ ትንሽ ደም የቀላቀለ ፈሰሽ መፍሰስ የተለመደ ነው።

ካቴተር ከገባ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የማህጸን መከማተር ሊሰማሽ ይችላል። ይህ የማህጸን መከማተር ሂደት በድግግሞሽና በጥንካሬ ይለያያል። ለብዙ ሰዓታት ሊቆይ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ይህ ሂደት ምጥ እንዲጀምር ሊያደርግ ይችላል።

በፊኛ ካቴተር ይዘሽ ወደ ቤትሽ መሄድ የመቻልሽ ሁኔታ ምጥ ማስጀመር ባስፈለገበት ምክንያትና ቤትሽ ከሆስፒታሉ ባለው ርቀት ላይ የተመካ ነው። ካቴተሩ በራሱ ካልወደቀ ከ12-36 ሰዓታት በኋላ እንዲወጣ የደረጋል።



የማህጸን ጭፍ መሳሰት ሲጀምር ፊኛው መውጣቱ የተለመደ ነው። ፊኛው ከወደቀ፣ የእንሽርት ውኃ ከፈሰሰ፣ ማህጸንሽ መከማተር ከጀመረ ወይም ደም ሊፈሰስ ከጀመረ እኛን ልታነጋግሪን ይገባል።

ፊኛው ከወደቀ በኋላ የማህጸን መከማተር እንዲጀምር በሆርሞኖች ምጥን እንዲቀጥል እናደርገዋለን። ይህ ወዲያውኑ አይሆንም።

ከዚህ በኋላ የምናደርገው ነገር ምጥን ማስጀመር ባስፈለገበት ምክንያትና በማዋለጃ ክፍል ለመውለድ በገቡ ሴቶች ብዛት ላይ የተመካ ነው።

Illustrasjon: Eline Skirmisdottir Vik

**ከፕሮስታግላንዲን ምጥን ማፋጠን**

ፕሮስታግላንዲን ሰው ሰራሽ በሆነ መልኩ የሚመረተው ሆርሞን ሲሆን በሴት ብልት ውስጥ በእንክብል ወይም በጄል መልክ ይሰጣል። መድሃኒቱን በየአራት ወይም በስድስት ሰዓቶች ይሰጣል። የመዋለጃ ክፍል መድኃኒቱ እንዴት እንደሚሰጥ ይወስናል።

የሆነ መድሃኒት ከመስጠታችን በፊት የማሕጸን መከማተርና የልጁ የልብ ምት በሲቲጂ ይለካል። በየአራት ወይም በስድስት ሰዓታት አንድ ዶክተር ወይም አዋላጅ በብልት የማህጸንን ጭፍ መሳሰት ይለካሉ። የማህጸን ጭፍ እስኪሰላፍ ማሕጸንዎ መከማተር እስኪጀምር ድረስ የሚያስፈልጋችን የእንክብል ወይም ጄል መጠን ከሴት ወደ ሴት ይለያያል።

አዋላጅ/ሐኪሙ ምጥ ለማስጀመር የተሰጠውን መድሃኒት ምን ያክል ውጤታማ እንደሆነ እንዲሁም የአንቺና የልጁን ሁኔታ በተከታታይ ይገመግማል፣ በሚያገኘው ውጤት መሠረትም ተጨማሪ ሕክምናና ክትትል ያደርጋል።

በመጀመሪያዎቹ ሰዓታት ውስጥ አጭር እና ተከታታይ የማህጸን መከማተርና እንደ የወር አበባ መሰል ህመም ሊሰማሽ የተለመደ ነው። እንደነዚህ ያሉት አጭር የማሕጸን መከማተር ወደ ዋነኛው ምጥና መውለድ ሊለወጡ ይችላሉ።

በፊቻ እና በፕሮስታግላንዲን በመታገዝ በጥቂት ቀናት ውስጥ ምጡን ማስጀመር ካልቻልን የእንሽርት ውኃን ሸፍኖ የያዘውን የመምብራና ሽፋን በመውጋት ወይም የማሕጸን መኮማተር የሚያፋጥን መድሃኒት በነጠብጠብ በመስጠት ምጡ እንዲጀምር ማድረግ እንችላለን።

አልፎ አልፎ የማሕጸን ጫፍ ይበልጥ እንዲሳሳ ምጡ ለተወሰነ ቀናት እንዲቆይ ሊደረግ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ መፍትሔ ግን ብዙውን ጊዜ ከአንቺ ጋር አስቀድሞ በመስማማት የሚደረግ ነው።

በአምሲዮቶሚ / የማሕጸን መኮማተር በሚያቀላጥፍ መድሃኒት ምጡን ማፋጠን

የማሕጸን ጫፍ ቢሳሳም ምጡ ግን በትክክል ካልጀመረ አዋላጅዎ ወይም ሐኪሙ የእንሽርት ውኃን ሸፍኖ የያዘውን የመምብራና ሽፋን ከፕላስቲክ በተሰራ ቀጭን ሹል ነገር መውጋት እንዲፈስ ያደርጋል፤ ብዙዎች ከዚህ በኋላ የጠነከሩ የሚሄድ የማሕጸን መኮማተር ይሰማቸዋል። ይህ እንደ መደበኛ የሴት ብልት ምርመራ የሚሰማው ስሜት ይኖረዋል። ለህፃኑ ግን ህመም የለውም። ከዚህ በፊትም ሆነ በኋላ የልጁ የልብ እንቅስቃሴ ይመዘገባል።



Illustrasjon: Eline Skinnisdottir Vik

ብዙውን ጊዜ የማሕጸን መኮማተር የሚያፋጥን መድሃኒት በነጠብጠብ መልክ መስጠት አስፈላጊ ነው። በዚህ መንገድም ሰውነት አክሲቶሪን የተባለውን ሆርሞን ይሰጠዋል፤ ይህም ማሕጸንን መኮማተር እንዲጀምር ይረዳዋል። ምጡ በዚህ መድሃኒት እንዲጀምር ከተደረገ፣ የሕፃኑ የልብ ምት እና የማሕጸንን መኮማተር ይበልጥ በቅርብ ክትትል ይደረግበታል። ስለዚህ የሕጻኑን የልብ ምትና እንቅስቃሴን የሚመዘግብ የሲቲጂ መሣሪያ ከሰውነት ስንገናኝዋለን። ሲቲጂ የሕጻኑን የልብ ምትና እንቅስቃሴን እንዲሁም የእናቱን የማሕጸን መኮማተር የሚከታተልና የሚመዘግብ የኤሌክትሮኒክ መሳርያ ነው።

ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ይጠይቁን፣ ልንረዳችሁ ዝግጁ ነን። እንኳን ደህና መጣችሁ!